



جوجه‌های یکروزه را قبل از خروج از جوجه‌کشی، علیه بیماری‌های نیوکاسل و برونشیت عفونی واکسینه نمائید.



Hatchpak avinew

واکسن نیوکاسل هچ پک اوینیو

و



Hatchpak H120

واکسن برونشیت هچ پک اچ ۱۲۰

مخصوص استفاده در جوجه‌کشی توسط کمپانی مریال فرانسه تولید و طراحی گردیده اند. مخلوط این دو واکسن به روش اسپری توسط دستگاه کابین اسپری با قطر ذرات ۱۰۰-۱۲۰ میکرون بر روی جوجه‌های یکروزه صورت می‌پذیرد و سبب ایجاد ایمنی مخاطی

- (۱) دستگاه تنفس (استنشاق ذرات واکسن توسط جوجه‌ها)
- (۲) دستگاه گوارش (از طریق خوردن قطرات ریخته شده بر روی کارت‌ن و گُرک پرها)

علیه بیماری‌های نیوکاسل و برونشیت عفونی در جوجه‌ها می‌گردند.

مزایای استفاده از واکسن‌های هچ پک (اوینیو و برونشیت عفونی. اچ ۱۲۰) در جوجه‌های یکروزه در جوجه‌کشی

- (۱) مقرون به صرفه و ارزانتر از سایر واکسن‌ها می‌باشند.
- (۲) مصرف واکسن‌های مذکور در محیط بهداشتی و تمیز جوجه‌کشی و زیر نظر افراد آموزش‌دیده صورت می‌پذیرد.
- (۳) واکسن‌های هچ پک برای استفاده در دستگاه کابین اسپری طراحی و تولید گردیده‌اند.
- (۴) با استفاده از این روش واکسیناسیون در جوجه‌کشی خطاهای ناشی از تهیه و آماده سازی و مصرف واکسن‌ها در واحد مرغداری کاهش می‌یابد.
- (۵) با مصرف مخلوط این واکسن‌ها در جوجه‌کشی، دیگر نیازی به مصرف واکسن‌های نیوکاسل و برونشیت عفونی در سنین ۱۰-۱ روزگی دوره پرورش نخواهند بود (کاهش تراکم انجام واکسیناسیون در مرغداری). لذا استرس به جوجه‌ها وارد نخواهد شد و رشد بهتری خواهند داشت.
- (۶) پرورش‌دهندگان جوجه (مرغداران) فرصت پیدا خواهند نمود که در سنین ۱۰-۱ روزگی پرورش با فراغت به مسائل مدیریتی بپردازند.



برنامه پیشنهادی واکسیناسیون با استفاده از واکسنهای هج پک در جوجه کشی و ادامه واکسیناسیون در واحد مرغداری

سن جوجه	نام واکسن	نوع واکسن	روش تجویز	نام بیماری مورد پیشگیری
یک روزگی در جوجه کشی	● هج پک اوینیو	زنده	اسپری ، با دستگاه کابین اسپری	● نیوکاسل ● برونشیت عفونی
	● گالیمون ۲۰۸ ● گالیمون ۳۰۸	کشته - روغنی	تزریقی ، زیر جلد ناحیه گردن	● نیوکاسل + آنفلوانزا ● نیوکاسل + آنفلوانزا + گامبورو



ادامه برنامه پیشنهادی واکسیناسیون در واحد مرغداری

سن جوجه	نام واکسن	نوع واکسن	روش تجویز	نام بیماری مورد پیشگیری
۱۰-۱۴ روزگی	● گالیواک آی ، بی ، ۸۸	زنده	اسپری - قطره چشمی - آشامیدنی	● برونشیت عفونی طیور ناشی از سویه 793B
۱۴-۱۸ روزگی	● اوینیو	زنده	اسپری - قطره چشمی - آشامیدنی	● نیوکاسل
۲۱-۲۲ روزگی	● بیورال اچ ۱۲۰	زنده	آشامیدنی	● برونشیت عفونی

● برنامه واکسیناسیون در واحد مرغداری برای کنترل بیماریهای نیوکاسل و برونشیت عفونی برای شرایط معمول پیشنهاد می گردد. در مناطق با آلودگی بالا و یا در حالت اپیدمی بیماری با دامپزشک خود مشورت نمائید .

